

Chapitre 1 - Exercices

1 Logique, notations mathématiques

Exercice n° 1

Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- a) $\forall x \in \mathbb{R}, x > 2 \implies x \leq 3$ c) $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^+)^2, x < y \implies |x| < |y|$
b) $\exists x \in \mathbb{R}^+ / x < \sqrt{x}$ d) $\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N} / n^2 > N$

Exercice n° 2

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ecrire avec le formalisme mathématiques les propriétés suivantes de f .

- a) L'image de 5 par f est 2. d) f admet un maximum.
b) 5 est l'unique antécédent de 2 par f . e) f est croissante sur \mathbb{R} .
c) $f(x) = 0$ admet des solutions.

Exercice n° 3

1. Parmi les fonctions de référence : \cos , \sin , \ln , \exp , $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto x^2$ quelles sont-elles qui vérifient les propriétés suivantes (\mathcal{D} est le domaine de définition de la fonction f).

- a) $f(0) \in \{0; 1\}$ c) $\exists A \in \mathbb{R} / \forall x \in \mathcal{D}, f(x) < A$
b) $\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \geq 0$ d) $\forall (x, y) \in \mathcal{D}^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$

2. Exprimer les négations des propriétés ci-dessus.

2 Calculer dans \mathbb{R}

Exercice n° 4

Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les expressions suivantes :

$$A = 3^{n+2} - 3^{n+1} - 7 \times 3^n + 6 \times 3^{n-2} \quad ; \quad B = \frac{5^n \times 12^2}{10^n \times 6^4} \quad ; \quad C = \frac{4^n 3^{2n-1}}{2^n 3^n + 1} \quad ; \quad D = \frac{16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n}$$

Exercice n° 5

Soit x et y , des complexes.

- a) Développer les expressions : $A = (x^3 - 1)^2$; $B = (x - 3y^5)(x + 3y^5)$; $C = (x + y)^3$.
b) Factoriser au maximum les expressions : $D = x^7 y^2 + 5y^3 x$; $E = x^4 + 4x^2 + 4$; $F = xy - xy^3$.

Exercice n° 6

Soit $(a_i)_{i \in [0;3]} \in \mathbb{R}^4$ et $(b_i)_{i \in [0;3]} \in \mathbb{R}^4$. Soit la fonction $P(x) = \left(\sum_{i=0}^3 a_i x^i \right) \times \left(\sum_{j=0}^3 b_j x^j \right)$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- a) De tête, savez-vous donner le degré de $P(x)$ ainsi que son coefficient dominant ?
b) Développer $P(x)$ et donner ses coefficients.

Exercice n° 7

Résoudre dans \mathbb{R} les équations suivantes :

— Niveau 1 $(E_1) : \frac{7t+1}{3} = \frac{2t-5}{\sqrt{3}}$; $(E_2) : (x-3)(7-5x) = 0$; $(E_3) : |5-x| = -1$.

- Niveau 2 $(E_4) : (2x - 3)^2 = 4$; $(E_5) : x^2 - x = (3x^2 + 1)(x - 1)$; $(E_6) : |\pi - 2x| = 5$.
- Niveau 3 $(E_7) : t^4 + t^2 + 1 = 0$; $(E_8) : x^3 = x^2 + x - 1$; $(E_9) : |x| = |x^2 + x - 3|$.

Exercice n° 8

Résoudre dans \mathbb{R} les inéquations suivantes :

- Niveau 1 $(I_1) : x + 2 < 7x - 3$; $(I_2) : (Y + 3)(Y - 1) \geq 0$; $(I_3) : |3 - x| < \sqrt{2}$.
- Niveau 2 $(I_4) : (2x + 1)(x^2 - 3x - 2) \geq 0$; $(I_5) : \frac{2x^2 + x - 1}{3x^2 - x - 7} \geq 0$; $(E_6) : |\pi - 2x| > 5$.

Exercice n° 9

1. Trouver une équation dont la solution est $\{1; 2\}$. En trouver une autre.
2. Trouver une inéquation dont la solution est $[3; 5]$. En trouver une autre dont la solution est $[3; 5[$.
3. Soit a et b des éléments de $[2; 3]$. Donner les meilleurs encadrements possibles pour les nombres $7a + 1$; $a^2 - 3b$ et $\frac{a+1}{b-1}$.

Exercice n° 10

Corriger les éventuelles erreurs du raisonnement suivant :

Soit un réel $x \in [-2; 4[$. On a clairement $0 \leq |x| < 4$ et donc $3 \leq |x| + 3 < 7$.
 Par ailleurs, toujours car $x \in [-2; 4[$, on a : $x^2 \in [4; 16[$ et donc $x^2 + 4 \in [8; 20[$.
 On en déduit que $0 \leq \frac{|x| + 3}{x^2 + 4} < \frac{7}{20}$.

3 Raisonnements

Exercice n° 11

- a) Soit x et y des réels. Montrer que $2xy \leq x^2 + y^2$. Dans quel cas y a-t-il égalité?
- b) En déduire que, si x et y sont strictement positifs alors $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$.

Exercice n° 12

Soit x et y des réels positifs.

- a) Montrer que $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$.
- b) En déduire que, si $x \geq y$ alors $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y}$.

Exercice n° 13

Prouver par récurrence les propriétés suivantes :

- a) $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- b) $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$
- c) Pour tout entier naturel n , $4^n - 1$ est un multiple de 3

Exercice n° 14

Montrer que si un réel s'écrit sous la forme $a + b\sqrt{2}$ avec a et b des entiers relatifs, alors cette écriture est unique.